

# Acetium®

สำหรับเกสัชกร



## Acetium® Lozenge

### QUIT SMOKING - NICOTINE FREE.

ลูกอม อะซีเตียม - ลูกอมช่วยเลิกบุหรี่ แบบไร้สารนิโคติน

- ทางเลือกใหม่ ของการเลิกบุหรี่ ผ่านการรับรองจาก อย. ประเทศไทยแล้ว
- มีผลการศึกษาทดลองทางคลินิกยืนยัน ถึงโอกาสสำเร็จในการเลิกบุหรี่ที่เพิ่มขึ้น
- ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง
- ผลิตภัณฑ์ใหม่ นำเข้าจากประเทศฟินแลนด์

 IMPORTED  
FROM FINLAND

**BIOHIT HealthCare**

Innovating for Health

## ● ลูกอม อะซีเตียม

ลูกอม อะซีเตียม ทางเลือกใหม่ของการเลิกบุหรี่แบบไร้สารนิโคติน ปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง โดยลูกอมที่ละลายในปากจะช่วยจับกับสารก่อมะเร็ง (Acetaldehyde) ที่มีในควันบุหรี่ ทำให้มีผลช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ ประสิทธิภาพของลูกอมอะซีเตียมได้ถูกประเมินในการทดลองทางคลินิกถึงสองการทดลอง ด้วยผลการศึกษาที่สอดคล้องกันโดยการใช้ลูกอมอย่างสม่ำเสมอระหว่างการสูบบุหรี่ เพิ่มโอกาสสำเร็จในการเลิกบุหรี่สูงกว่าการหักดิบถึง 4.5 เท่า

## ● ปลอดภัย ไร้สารนิโคติน

ลูกอม อะซีเตียม (Acetium® Lozenge) เป็นตัวช่วยในการเลิกบุหรี่ บรรเทาการเสพติดบุหรี่ และ ลดความอยากบุหรี่ โดยมีสารออกฤทธิ์หลักคือ แอล-ซิสเตอีน (L-cysteine) ซึ่งเป็นกรดอะมิโนธรรมชาติ ที่จะดักจับสารพิษที่ออกมาจากควันบุหรี่ระหว่างที่อมลูกอมไปพร้อมกับการสูบบุหรี่ ส่งผลทำให้ความรู้สึกลอยอยากสูบบุหรี่บรรเทาลง จึงเป็นตัวช่วยให้เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ แบบไม่ต้องหยุดสูบบุหรี่ขณะที่ใช้ และไม่ทรมาณจากอาการขาดนิโคติน

อม พร้อม สูบ!

## ● วิธีใช้

อมลูกอมอะซีเตียม 1 เม็ดทุกครั้งก่อนสูบบุหรี่  
ปล่อยให้ลูกอมละลายในปากช้าๆ ระหว่างที่สูบบุหรี่  
หากต้องการสูบบุหรี่ต่อ สามารถอมลูกอมอะซีเตียมเพิ่มได้  
โดยอมลูกอมต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าลูกอมจะละลายหมด

## ● ปริมาณบรรจุ

ลูกอมอะซีเตียม 1 กล่อง  
บรรจุกล่องละ 10 เม็ด และ 30 เม็ด

โปรดศึกษารายละเอียดในเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ ที่มากับบรรจุภัณฑ์ก่อนการใช้



# บันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์ Acetium สำหรับเภสัชกร

- ลูกอมอะซีเตียม 3 กล่อง เป็นปริมาณที่เหมาะสมกับผู้ที่ตั้งใจ ที่จะใช้ลูกอมอย่างสม่ำเสมอ ตลอดระยะเวลาที่ตั้งใจเลิกสำหรับผู้สูบบุหรี่ประมาณวันละ 5 – 10 มวน (จะใช้ได้ต่อเนื่องโดยประมาณ 7-10 วัน) หรือ ผู้ที่สูบบุหรี่ประมาณวันละ 10 - 20 มวน (จะใช้ได้ต่อเนื่องโดยประมาณ 3-4 วัน)
- จากผลงานวิจัย ผู้ที่มีความตั้งใจจะเลิกบุหรี่ จะเลิกสำเร็จเมื่อใช้ลูกอมอะซีเตียมพร้อม การสูบบุหรี่ติดต่อกัน เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน (อาจใช้ระยะเวลาสั้นกว่าหรือ นานกว่า ขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ความสม่ำเสมอในการใช้ลูกอม และความแตกต่างทาง สุขภาพของแต่ละบุคคล)
- ลูกอมอะซีเตียม 1 กล่อง มีปริมาณ 30 เม็ด โดยบรรจุอยู่ในแผงอลูมิเนียมแผงละ 10 เม็ด กล่องละ 3 แผง
- ลูกอมอะซีเตียม ใช้เพื่อเป็นตัวช่วย ในการเลิกบุหรี่ ให้มีความสำเร็จมากขึ้น
- ลูกอมอะซีเตียม เป็นลูกอมที่ใช้พร้อมการสูบบุหรี่ โดยก่อนการจุดบุหรี่สูบให้อมลูกอม ไว้ในปาก แล้วจุดบุหรี่สูบตามปกติ
- การใช้ลูกอมอะซีเตียม นั้น ไม่ต้องหยุดสูบบุหรี่ ไม่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกาสูบบุหรี่ เพียงแต่เข้าไปพร้อมกันกับการสูบบุหรี่
- ลูกอม 1 เม็ดประกอบด้วย L-cysteine 3 mg ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์หลัก และสารอื่น ๆ ได้แก่ Xylitol 250 mg, Sorbitol 224 mg, Smoke flavor 5 mg, Anise flavor 7.5 mg, Magnesium stearate 10 mg และ Silicon dioxide 0.5 mg
- เมื่อเข้าสู่ช่องปาก ลูกอมจะปลดปล่อย L-cysteine ออกมาสู่น้ำลายอย่างช้า ๆ โดยสามารถ จับกับอนุพันธ์ Acetaldehyde (สารก่อมะเร็งที่มาจากควันบุหรี่) ได้ถึง 90%
- การอมลูกอมอะซีเตียมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ อมลูกอมทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ สูบบุหรี่ และไม่แนะนำให้บริโภคเครื่องดื่ม หรือสารอื่นขณะอม เพราะจะทำให้ ประสิทธิภาพของเม็ดอม ลดลง
- ลูกอมมีส่วนช่วยทำให้ปากสะอาด สดชื่น โดย Xylitol จะช่วยลดการสะสมคราบหินปูน
- ห้ามใช้ลูกอม ในผู้ที่แพ้ส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ ห้ามใช้ในเด็ก สตรีมีครรภ์ สตรีที่ให้นมบุตร ผู้ที่ไตทำงานผิดปกติ หรือ มีภาวะ Cystinuria
- ลูกอมอะซีเตียมไม่สามารถลดผลเสียทางสุขภาพอื่น ๆ ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ได้
- หากเกิดอาการข้างเคียงจากการใช้ลูกอม โปรดพบแพทย์ เพื่อรับคำปรึกษา หรือติดต่อผู้นำเข้า

# แบบทดสอบระดับการใช้บูรี

กรุณาใส่เครื่องหมาย ( x ) ในช่องที่ตรงกับคำตอบของท่าน

หลังจากตื่นนอน สูบบุรี่ี่มวนแรกเมื่อไหร่	ภายใน 5 นาที 6-30 นาที 31-60 นาที หลังจาก 60 นาที	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
คุณประสบความลำบากในการยับยั้งชั่งใจในการสูบบุรี่ี่ ในสถานที่ห้ามสูบบุรี่ี่หรือไม่ เช่น โรงพยาบาล ห้องสมุด ฯลฯ	ใช่ ไม่ใช่	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
หากต้องงดสูบบุรี่ี่หนึ่งมวนในช่วงเวลาหนึ่งของวัน คุณประสบปัญหาในการงดในช่วงเวลาใดมากที่สุด	ช่วงเช้า ช่วงเวลาอื่นของวัน	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
คุณสูบบุรี่ี่กี่มวนต่อวัน	น้อยกว่า 10 11 - 20 21 - 30 มากกว่า 31	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3
คุณสูบบุรี่ี่ในช่วงเช้าบ่อยกว่าช่วงเวลาอื่นหรือไม่	ใช่ ไม่ใช่	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
คุณสูบบุรี่ี่หรือไม่ แม้ว่า คุณจะรู้สึกไม่สบาย หรือป่วยติดเตียง	ใช่ ไม่ใช่	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
	คะแนนรวม	
คะแนน	1-2 = มีระดับความพึ่งพาต่ำ 3-4 = มีระดับความพึ่งพาต่ำจนถึงปานกลาง	5-7 = มีระดับความพึ่งพาปานกลาง 8+ = มีระดับความพึ่งพาสูง



Precision Health

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายในประเทศไทย

บริษัท ปริซิชั่น เฮลท์ จำกัด

1133/15 ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300



Tel 062 547 5475



info@precisionhealth.co.th



@Acetiumthailand

ศูนย์ข้อมูลการเลิกบุหรี่ Acetium Thailand

www.acetiumthailand.com